

エリプタ

【レルベア、アノーロ、テリルジー、アニュイティ、エンクラッセ】



ID	氏名	(T・S・H 年 月 日)
依頼医 金沢市立病院	医師	
<input type="checkbox"/> レルベア <input type="checkbox"/> アノーロ <input type="checkbox"/> テリルジー <input type="checkbox"/> アニュイティ <input type="checkbox"/> エンクラッセ		
エリプタトレーナー(可・不可)	インチェック(L/ min)

↓ 注意点、確認点

1 カウンターの表示を確認する	<input type="checkbox"/>	・・・ 文字が見えているか。残り数が表示
2 エリプタのカバーを開ける	<input type="checkbox"/>	・・・ 手間がかかっていないか。 カチッとなるまで開けたか。
3 吸入器を水平に保持する	<input type="checkbox"/>	
4 吸入口をさけて、十分息を吐き出す	<input type="checkbox"/>	・・・ 吸入口に息を吹きかけていないか
5 吸入口を適切にくわえる	<input type="checkbox"/>	・・・ □と吸入口に隙間ができていないか
6 十分な深吸気量(はやく深く)	<input type="checkbox"/>	
7 息止め(5秒以上)	<input type="checkbox"/>	・・・ できれば10秒程度。 _____ 秒
8 吸入後カバーを閉じる	<input type="checkbox"/>	
9 吸入後うがいをする	<input type="checkbox"/>	・・・ がらがら2回、ぶくぶく2回
理解度		
* 吸入回数を理解している	<input type="checkbox"/>	・・・ 1日_____回、1回_____吸入
* 吸入薬の薬効を理解している	<input type="checkbox"/>	・・・ コントローラー
* 副作用を理解している	<input type="checkbox"/>	・・・ 声がれ、カンジダ、動悸、手の震えなど

3:できた 2:少しできた 1:できない

通信欄

- ・手技不良のため薬剤変更 : 要 不要
- ・コンプライアンス : 良 時々忘れる よく忘れる
- ・副作用出現 : 嘔声 口内痛 動悸 振戦 その他()

コメント

評価日 _____ 年 月 日 薬局 薬剤師 _____