

【テオフィリン製剤】チェックシート

確認事項		<input checked="" type="checkbox"/>
症状	消化器症状（食欲不振、嘔気・嘔吐、胃部不快感、下痢）	
	不整脈（頻脈、動悸、脈の乱れ）	
	頭痛、不眠	
	痙攣	
喫煙状況の変化（受動喫煙を含めて）		
セイヨウトギリソウ含有製品の使用		
カフェインを多く含むコーヒーや紅茶などの多飲		

中毒を起こしやすい患者：心不全、肺炎、肝硬変、小児 など

金沢市立病院 薬剤室 2020.12 作成

(注) 本チェックシートは必要最小限の確認事項であることをご了承ください。
医薬品の相互作用に関しても、添付文書を参照ください。

[ジギタリス製剤] チェックシート

確認事項		<input checked="" type="checkbox"/>
症状	消化器症状（食欲不振、嘔気・嘔吐、下痢）	
	神経症状（頭痛、めまい、失見当識、錯乱、せん妄）	
	視覚症状（光がないのにちらちら見える、黄視、緑視、複視など）	
	不整脈（徐脈、脈の乱れ、動悸）	
セイヨウトギリソウ含有製品の使用		

中毒を起こしやすい患者：腎機能低下
電解質異常（低K、高Ca、低Mg血症）など

金沢市立病院 薬剤室 2020.12 作成

(注) 本チェックシートは必要最小限の確認事項であることをご了承ください。
医薬品の相互作用に関しても、添付文書を参照ください。